

GRUPO QUIMICO: ORGANOCHLORINE.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO.
- DURANTE EL MANIPULEO DEL PRODUCTO EVITAR EL CONTACTO CON LA PIEL Y MUCOSAS. NO INHALAR LOS VAPORES DEL PRODUCTO FORMULADO NI LA NEBLINA DE PULVERIZACIÓN.
- USAR ROPA ADECUADA, COMO OVEROL DE MANGA LARGA, PROTEGER LOS OJOS USANDO LENTES. USAR MÁSCARA PROTECTORA ESPECIAL DE FILTRO, NO MANIPULAR EL PRODUCTO DIRECTAMENTE CON LAS MANOS, USAR GUANTES Y BOTAS DE GOMA.
- NO UTILIZAR EQUIPOS CON PÉRDIDAS Y NO DESTAPAR BOQUILLAS O TUBERÍAS CON LA BOCA.
- EL USO DE ESTE PRODUCTO ES EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA. APLICAR SÓLO LA DOSIS RECOMENDADA. PULVERIZAR A FAVOR DEL VIENTO, EVITAR EN LO POSIBLE LOS DIAS CALIDOS Y VENTOSOS.
- REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:

- Evitar su transporte y almacenamiento junto con alimentos, bebidas, alimentos para animales, medicinas de uso humano ni veterinario.
- Almacenarlos en sus envases originales debidamente cerrados en lugares frescos, ventilados y bajo llave, fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- No comer, no fumar y no beber durante su manipuleo, preparación y aplicación.
- No es inflamable a temperaturas normales de uso y almacenamiento.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:

- Prácticamente no tóxico para aves, peces y Daphnia magna. Altamente tóxico para algas y Ligeramente tóxico para abejas.
- No aplicar cerca de cuerpos de agua. No contaminar lagos, fuentes, ríos y demás canales de agua lavando los envases o vertiendo los residuos del tanque de aplicación.
- No aplicar con abejas presentes o sobre colmenas en actividad. Dar avisos a los apicultores cercanos antes de la aplicación para el cierre de las colmenas, si las colmenas no pueden ser cerradas, tapar la entrada durante la aplicación con espuma de gomas. Asperjar durante la mañana o la noche, fuera del horario de pecoreo de las abejas.

SINTOMAS DE INTOXICACION: Mareos, náuseas, vómitos, dolor abdominal, depresión general, letargo y disnea. Tras exposición a grandes cantidades daños sobre el hígado.

PRIMEROS AUXILIOS: POR INGESTIÓN: Mantenga al paciente en reposo, lave la boca con abundante agua, de a beber abundante agua. No provoque el vómito. Consulte inmediatamente a un médico. POR INHALACIÓN: Remover a la persona a un lugar bien ventilado. Mantenga libre las vías respiratorias. Consulte a un médico si se manifiestan molestias inmediatamente. POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lavarlos con agua limpia por 15 minutos con párpados abiertos. Remover lentes de contacto en los primeros 5 minutos. Consulte inmediatamente a un médico. POR CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa y lave la parte afectada con abundante agua y jabón. Consulte a un médico. Nunca dé a beber ni induzca el vómito a personas en estado de inconsciencia.

EN CASO DE INTOXICACION LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LLAME AL 800-10-6966, CENTRO DE INFORMACION TOXICOLÓGICA. HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONÉS, SANTA CRUZ - BOLIVIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No hay antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.



USO AGRÍCOLA

Soyaflog

HERBICIDA POST-EMERGENTE SELECTIVO Y DE CONTACTO

Formulación: CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN QUIMICA:

FOMESAFEN: 5-(2-chloro- α,α -trifluoro-p-tolyloxy)-N-mesy-1-2-nitrobenzamide 250 g/l
 Ingredientes inertes: 750 g/l
 Total: 1000 g/l

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Registro en Bolivia, SENASAG N°

TITULAR DE REGISTRO:

RAINBOWCHEM AGROSCIENCE S.A.
 Av. San Martín N° 115, Edificio Tamarindo of. 3
 Telf. (591) 3-3394555
 Santa Cruz - BOLIVIA

FABRICANTE:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD.
 Dir. Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong 262737
 Teléfono : +86-531-88875230, 88875231
 Website: <http://www.rainbowchem.com>
 Email: rainbowchem@rainbowchem.com
 Origen - China

Lote #: _____ F. fabr.: _____ F. Venc.: _____

CONTENIDO NETO:

0,1L, 0,125L, 0,15L, 0,2L, 0,25L, 0,5L, 0,9L, 0,95L, 1L, 3,5L, 4L, 5L, 10L, 15L, 19L, 20L, 50L, 100L, 110L, 120L, 200L, 220L, 250L, 1000L

NO EXPLOSIVO – NO INFAMABLE – NO CORROSIVO
 CLASE TOXICOLÓGICA IV – PRECAUCION

CONDICIONES GENERALES:

SOYAFLAG (Fomesafen 25%) es un herbicida post-emergente de contacto, selectivo para el cultivo de Soya. Absorbido por las hojas y las raíces. Actúa inhibiendo la enzima Protoporfirinógeno oxidasa (PROTOX) en la biosíntesis de la clorofila lo que origina la formación de oxígeno simple que, a su vez, causa un daño irreversible en la membrana celular, provocando la muerte de la planta.

CONDICIONES PARA SU APLICACIÓN:

- Se recomienda aplicar cuando las malezas y el cultivo no esten soportando condiciones de sequía y la temperatura no supere los 30 °C.
- No aplicar con vientos fuertes (mayores a 10 km/h).
- Aplicar en dirección a favor del viento, nunca en contra porque podría ser peligroso para el aplicador y por la deriva a cultivos vecinos.
- Evitar aplicar en las horas más calurosas del día. Aplicar preferentemente en las últimas horas de la tarde o primeras horas de la mañana.
- No aplicar si hay amenaza de lluvia.

MÉTODO DE APLICACIÓN:

- En aplicaciones terrestres, usar equipos pulverizadores calibrados para funcionar a 60-100 lb-pul/g2 en aplicaciones de post-emergencia. Emplear boquillas de tipo abanico plano NO 80015, 8002, 8003 o sus equivalentes de 110°. Utilizando un volumen de agua de 150-200 l/ha.
- En aplicaciones aéreas, puede aplicarse con avión con un caudal mínimo de 20 l/ha.

INSTRUCCIONES DE USO:

Preparado del caldo de aplicación, para equipo tractorizado: Prellenar ¼ del tanque del pulverizador con agua limpia. Adicionar al tanque la cantidad recomendada del producto. Completar el tanque con agua y mantener el caldo con agitación continua durante toda la operación.

NÚMERO Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar el herbicida SOYAFLAG cuando las malezas tengan de 2 a 3 hojas o tamaño de 5 cm y en pleno desarrollo vegetativo del cultivo de soya. Se debe realizar una sola aplicación.

FITOTOXICIDAD: No se han observado efectos fitotóxicos en el cultivo, aplicando con las condiciones de uso y dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD: Este producto es incompatible con ácidos fuertes, bases y agentes oxidantes fuertes.

TIEMPO DE REINGRESO: 24 horas después de la aplicación.

PERIODO DE CARENANCIA: 60 días.

LMR: 0,05 mg/kg.

| CULTIVO | MALEZA CONTROLADA | DOSIS |
|-----------------------|-------------------------------|----------|
| SOYA (Glycine max) | Camotillo (Ipomea triloba) | 1,2 l/ha |

AVISO DE GARANTIA: El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y es apto para su uso, siguiendo las indicaciones dadas. El fabricante no es responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.



PRECAUCION

