

AZOTELA 85 WG

Fungicida agrícola

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingredientes activos:

Azoxystrobin**490 g/Kg**
methyl (E)-2-{2-[6-(2-cyanophenoxy) pyrimidin-4-yloxy]phenyl}-3-methoxyacrylate de formulación a 20°C.

Tebuconazole **360 g/Kg**
(RS)-1-p-chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol de formulación a 20°C.

Ingredientes aditivos **c.s.p. 1 Kg**

Registro Nacional ICA No. 1918

Titular del Registro: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

CONTENIDO NETO:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

No. de Lote:

Formulado por:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co. Ltd.

Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong 262737, China.

Tel: 86-531-88875222

www.rainbowchem.com

Importado y distribuido por:

CASA FERTIL S.A.S. ZOMAC

Carrera 14 N° 18-85 Brr. Centro

Centro Granada Meta

Teléfono: 3203850468

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III – LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

Franja de color azul (Azul Pantone 293-C)

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y ALIMENTOS”
“NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”
“CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS”
“CUIDADO, EVITE EL CONTACTO, POSIBLE CARCINÓGENO”

Este fungicida no debe aplicarse cuando haya vientos fuertes para evitar daños a cultivos susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas.

Este producto puede ser mortal si se ingiere”

“ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ETIQUETADO Y CERRADO, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN”.

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”

“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN”

“NO ALMACENAR, NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES”

Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre. **“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”**. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas de caucho, visor, máscara especial para pesticidas y guantes de neopreno óPVC, **Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón**. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión.

“Conserve el producto en el envase original etiquetado y cerrado”.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE EL PACIENTE AL MEDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA.

“En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”

“EN CASO DE INGESTIÓN NO INDUZCA EL VOMITO, ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MAS CERCANA”

Inhalación: Trasladar a la víctima hacia un lugar bien ventilado. Mantener al afectado abrigado y en reposo. Si le cuesta respirar, suministrar oxígeno. Si no respira, efectúe respiración artificial. Buscar atención médica.

Ingestión: No induzca al vómito. Lávese la boca con abundante agua. No administre nada oralmente a una persona inconsciente. Acuda a un médico inmediatamente.

Contacto con la piel: Despójese de la ropa afectada y lave la zona expuesta al producto nocivo con jabón suave y agua; a continuación, enjuague con agua tibia. Consulte a un médico.

Contacto con los ojos: Lávelos con abundante agua fresca durante 15 - 20 minutos, manteniendo los párpados separados. En caso de irritación u otros síntomas, consulte a un médico para recibir tratamiento especializado.



EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM

01 800 09 16012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.

ELATIVAS A LA ELIMINACIÓN DE ENVASES VACÍOS

“Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.”

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

“Tóxico para aves, realice las aplicaciones cuando la actividad de las aves sea reducida”

Para aplicaciones terrestres y aéreas del producto se deben dejar franjas de seguridad de 10 y 100 metros respectivamente, con relación a los cuerpos de agua, casas o carreteras.


No contamine fuentes de agua.

“Tóxico para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre”

En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la normatividad local vigente. No utilice el mismo equipo de fumigación utilizado con **AZOTELA 85 WG**, para la aplicación de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, en un lugar oscuro, fresco y seco alejado del fuego o chispas. Siempre mantenga el producto en su empaque original. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar con los desechos, envases, residuos o aguas de lavado del equipo de aplicación.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

“CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO”

AZOTELA 85 WG es un fungicida de amplio espectro, con acción preventiva, curativa y erradicante; inhibe la germinación de las esporas y estados tempranos de desarrollo de los hongos, el crecimiento del micelio y la esporulación. Los mejores resultados se obtienen cuando es aplicado al inicio del progreso de la enfermedad en el cultivo. Cuando es aplicado, parte del producto es absorbido por la planta y se difunde dentro de la hoja y tallo donde tiene acción curativa, así mismo, inhibe la germinación de las esporas y protege contra nuevas infecciones.

El Tebuconazol afecta la membrana de los hongos patógenos inhibiendo la producción de ergosterol y Azoxystrobin tiene acción oligosistémica, alterando los procesos respiratorios en las mitocondrias de los hongos.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	P.C.	P.R.
Arroz (Oryza sativa)	Rhizoctonia solani	400 g/ha	15 días	4 horas

Periodo de Carencia (P.C.): Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Periodo de Reentrada (PR): Intervalo de tiempo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas al área o cultivo tratado.

NA: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Realizar una (1) sola aplicación por ciclo de cultivo. Se recomienda rotar **AZOTELA 85 WG** con otros fungicidas de diferente grupo y mecanismo de acción. La aplicación debe ser preventiva, con la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad o con la presencia de condiciones climáticas favorables para el desarrollo de *Rhizoctonia solani*.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: Calibre correctamente el equipo de aplicación. Utilice cualquier equipo terrestre provisto de boquillas de cono hueco que garanticen un tamaño de gota de 250 µm aprox. Use el volumen de agua requerido según el desarrollo del cultivo. Añada la mitad del volumen de agua seguido por la dosis recomendada de **AZOTELA 85 WG**, agite vigorosamente y luego añada agua hasta completar el volumen final, sin dejar de agitar a fin de obtener una completa dilución del producto y proceder a asperjar.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Antes de efectuar mezclas con otros productos fitosanitarios, se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad a las dosis recomendadas y aplicar en un área pequeña del cultivo. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso indicadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto”.

