

# EPOXICONAZOLE + CARBENDAZIM RAINBOW 250 SC

Fungicida agrícola

SUSPENSION CONCENTRADA - SC

## COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

### Ingrediente activo:

**Epoxiconazole** ..... 125 g/L  
(2RS,3SR)-1-(3-(2-chlorophenyl)-2,3-epoxy-2-(4-fluorophenyl)-propyl)-1H-1,2,4- triazoles  
de formulación a 20°C

**Carbendazim**.....125 g/L  
methyl benzimidazol-2-ylcarbamate de formulación a 20°C

**Ingredientes aditivos** .....c.s.p. 1 L

Registro Nacional ICA No. 1346

Titular del Registro: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

### CONTENIDO NETO:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

No. de Lote:

### Formulado por:

**SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co. Ltd.**

Binhai Economic Development Area,

Weifang, Shandong 262737, China.

Tel: 86-531-88875222

Website: [www.rainbowchem.com](http://www.rainbowchem.com)

### Importado y distribuido por:

**RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.,**

Carrera 11A # 93 A 80, Oficina 305

Teléfono: 57-1-6235967

NIT: 900382571-7

Bogotá, D.C.



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III – LIGERAMENTE PELIGROSO

**CUIDADO**

(Franja de color azul)

## **LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

### **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

**“NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA  
CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”**  
**“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE  
ANIMALES DOMESTICOS”**  
**“CAUSA IRRITACION MODERADA A LOS OJOS”**  
**“EVITA CONTACTO CON LA PIEL Y LA ROPA”**

**“Este producto puede ser mortal si se ingiere”**

“ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ETIQUETADO Y CERRADO, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN”.

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”

“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN”

“NO ALMACENAR, NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES”

Este fungicida no debe aplicarse cuando haya vientos fuertes para evitar daños a cultivos susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas.

Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre. "No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas de caucho, visor, mascara especial para pesticidas y guantes de neopreno ó PVC, Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión.

### **INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

**EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE EL  
PACIENTE AL MEDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA.**

“En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”

**“EN CASO DE INGESTIÓN NO INDUZCA EL VOMITO, ACUDA INMEDIATAMENTE A LA  
UNIDAD DE SALUD MAS CERCANA”**

Síntomas de intoxicación incluyen irritación, mareo, vómito, diarrea, debilidad.

No suministre nada por vía oral a una persona inconsciente.  
No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.



**EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 800 09 16012**  
**Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.**

### **RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN DE ENVASES VACIOS**

“Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión”

### **MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:**

“Tóxico para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre”

En caso de derrame, recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin”.

No utilice el mismo equipo de fumigación de **EPOXICONAZOLE + CARBENDAZIM RAINBOW 250 SC** para la aplicación de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado.

Evite contaminar con **EPOXICONAZOLE + CARBENDAZIM RAINBOW 250 SC** las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo.

Para aplicaciones terrestres y aéreas del producto, se deben dejar franjas de seguridad de 10 y 100 metros respectivamente, con relación a los cuerpos de agua, casas o carreteras.

### **ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO**

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). Siempre mantenga el producto en su empaque original. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar con los desechos, envases, residuos o aguas de lavado del equipo de aplicación.

Fecha de Aprobación ICA: 07/10/2013

Banda azul



## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

### “CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO”

**EPOXICONAZOLE + CARBENDAZIM RAINBOW 250 SC** es un fungicida que posee acción sistémica, con propiedades protectantes, curativas y erradicantes; compuesto por dos ingredientes activos: El **EPOXICONAZOLE**, un triazol de buen efecto sobre esporas y estructuras de desarrollo que inhibe el proceso de la biosíntesis del ergosterol, y el **CARBENDAZIM**, un bencimidazol que interviene en el proceso de la división celular, inhibiendo el desarrollo del tubo germinativo, la formación de apresorios y el crecimiento del micelio del hongo. Es absorbido por las plantas y actúa eficientemente frente a un amplio grupo de enfermedades que causan las mayores pérdidas al cultivo de arroz.

No aplique el producto si se espera lluvia una hora después de la aplicación, pues el nivel de control puede disminuir.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	PC*	PR*
Arroz	<i>Pudrición de la vaina</i> <i>Rhizoctonia solani</i>	0.75 litros por hectárea	7	4 horas

**P.C: Periodo de Carencia:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

**P.R: Periodo de Reingreso:** Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas al área o cultivo tratado.

### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar preventivamente con el inicio de los primeros síntomas cuando las condiciones ambientales favorezcan la enfermedad.

Contra pudrición de la vaina *Rhizoctonia solani*, aplicar de manera preventiva hacia los 25-35 días después de la siembra o del trasplante.

Se recomienda agitar el envase antes de usar el producto.

Aplicar una sola vez por ciclo de cultivo o cosecha, dentro de un programa de manejo integrado -MIP- (rotando con otros plaguicidas de diferente modo de acción o grupo químico) para evitar el desarrollo de la resistencia.

### EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

Use el volumen de agua requerido según el desarrollo del cultivo. Use boquillas de cono hueco y un tamaño de gota de 125 µm aprox.

### COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos.

No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

## INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto”.

Banda azul

