

SEEDGUARD 35 FS

Fungicida Agrícola

Suspensión Concentrada para tratar Semillas – FS

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingredientes activos:

Fludioxonil **25 g/L**
4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile de formulación a 20 ° C.

Metalaxil **10 g/L**
methyl N-(methoxyacetyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alaninate de formulación a 20 ° C.

Ingredientes aditivos **c.s.p. 1litro**

Registro Nacional ICA No. 1567
Titular del Registro: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

CONTENIDO NETO:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

No. de Lote:

Formulado por:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co. Ltd.

Binhai Economic Development Area,

Weifang, Shandong 262737, China.

Tel: 86-531-88875222

Fax: 86-531-88875232

Website: www.rainbowchem.com

Importado y Distribuido por:

CASA FERTIL S.A.S. ZOMAC

Carrera 14 N° 18-85 Brr. Centro

Centro Granada Meta

Teléfono: 3203850468

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III – LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

(Franja de color azul)

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

“CAUSA IRRITACION MODERADA A LOS OJOS”

“EVITE CONTACTO CON LA PIEL Y LA ROPA”

“NINGUN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS”

SEEDGUARD 35 FS no debe aplicarse cuando haya vientos fuertes para evitar daños a cultivos susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas.

“Este producto puede ser mortal si se ingiere”

Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre. **"No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.** Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas de caucho, visor, máscara especial para pesticidas y guantes de neopreno ó PVC, **Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.** Evite caminar dentro de la neblina de aspersión.

“ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ETIQUETADO Y CERRADO, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN”.

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”

“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN”

“NO ALMACENAR, NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES”

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE AL PACIENTE AL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

“En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”

“EN CASO DE INGESTIÓN NO INDUZCA EL VOMITO, ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MAS CERCANA”

INGESTIÓN: Si el producto fue ingerido, NO INDUZCA EL VÓMITO consiga atención médica inmediatamente, y muestre esta etiqueta o la hoja de seguridad del producto. Nunca de nada por la boca a una persona inconsciente

INHALACION: Mover a la víctima hacia el aire fresco. Si la respiración es irregular o cesa, administrar respiración artificial. Mantener al paciente en reposo y abrigado. Consiga atención médica de inmediato.

CONTACTO CON LA PIEL Retire la ropa contaminada inmediatamente y lave el área afectada con abundante agua y jabón por lo menos 15-20 minutos. Si la irritación persiste, consiga atención médica. La ropa contaminada debe ser lavada antes de volver a usarla.

CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Si están presentes, retire los lentes de contacto. Consiga atención médica inmediatamente.

Antídoto: No existe antídoto específico, Dar tratamiento sintomático.



EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.

RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN DE ENVASES VACIOS

“Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión”

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

**“Respetar las franjas de seguridad con relación a cuerpos de agua”
“Extremadamente tóxico para organismos acuáticos”**

No utilice el mismo equipo de fumigación de **SEEDGUARD 35 FS**, para la aplicación de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos

Evite contaminar con **SEEDGUARD 35 FS** las aguas que vayan a hacer utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo.


Para aplicaciones terrestres del producto, se deben dejar franjas de seguridad de 10 metros con relación a los cuerpos de agua, casas o carreteras

“Tóxico para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre”

En caso de derrame, recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin”

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). Siempre mantenga el producto en su envase original. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar con los desechos, envases, residuos o aguas de lavado del equipo de aplicación.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

“CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO”

SEEDGUARD 35 FS es un producto para tratamiento de semillas, el cual debe ser utilizado dentro de un programa de manejo integrado de plagas, enfermedades y de cultivo.

Asociación de fludioxonil: fenilpirrol con actividad fungicida por contacto, no sistémico, persistente, adecuado en aplicaciones foliares preventivas y en tratamientos de semillas de cereales, con metalaxil M: xililalanina sistémica con actividad fungicida y acción específica, preventiva y curativa, frente a Peronosporales: peronosporáceos (hongos productores de podredumbres de cuello y mildius) y pitiáceos (hongos productores de la caída de plantas de semillero) presentada en forma de suspensión concentrada para tratamiento de semillas. Actúa por contacto y por vía sistémica. El componente sistémico, metalaxil M, se trasloca en el interior de la semilla.

Asegura una rápida emergencia de plántulas más uniformes que contribuyen a obtener los máximos rendimientos y sus efectos sobre el stand de plantas y el desarrollo del cultivo son aún más evidentes cuando las condiciones de emergencia son adversas, como en siembra temprana y siembra directa.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	P.C	P.R
MAÍZ <i>Zea mays</i>	<i>Fusarium sp</i>	1.0 cm ³ /Kg de semilla. Realizar una sola aplicación	N.A.	N.A.

P.C: Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R: Período de reentrada: Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas al área o cultivo tratado.

N.A: No aplica.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Agite el producto antes de usarse. En general se recomienda utilizar para tratamiento de semillas un volumen de dilución (agua) entre 500 a 2.000 cm³, por tonelada de semilla, de acuerdo al tipo de semilla.

Realice el tratamiento de grandes lotes de semillas en equipo especializado. Si quiere mezclar **SEEDGUARD 35 FS** con otros productos (fungicidas e insecticidas), mezcle primero los otros productos con agua y por último el **SEEDGUARD 35 FS**. Se recomienda hacer una sola aplicación por temporada.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

Al aire libre, diluir la dosis del producto en la mitad del volumen de agua, haciendo un triple lavado del envase. Completar el volumen con agua agitando constantemente hasta obtener una mezcla homogénea. Utilice la cantidad de agua necesaria para lograr una buena cobertura.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

SEEDGUARD 35 FS es miscible con formulaciones de las mismas características. Antes de mezclar con otro producto se recomienda realizar previamente un ensayo de miscibilidad en pequeña escala.

SEEDGUARD 35 FS debe ser aplicado a semilla de buena calidad para asegurar una adecuada germinación y protección.

La semilla tratada con **SEEDGUARD 35 FS**, se puede guardar (bajo condiciones adecuadas de almacenamiento) durante un año presentando mejores porcentajes de germinación respecto a semillas no tratadas.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto”.