

# **RAINEB 70 WP**

**Fungicida agrícola**

**POLVO MOJABLE – WP**

## **COMPOSICIÓN GARANTIZADA**

**Ingrediente activo:**

**Propineb** ..... **700 g/Kg**

*Polymeric zinc propylenebis(dithiocarbamate) de formulación a 20 ° C*

**Ingredientes aditivos** ..... **c.s.p. 1 Kg**

**Registro Nacional ICA No.1624**

**Titular del Registro: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.**

**CONTENIDO NETO: 1, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100 Kilogramos**

**Fecha de Formulación:**

**Fecha de Vencimiento:**

**No. de Lote:**

**Formulado por:**

**SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co. Ltd.**

Binhai Economic Development Area,

Weifang, Shandong 262737, China.

Tel: 86-531-88875222

Fax: 86-531-88875232

Website: <http://www.rainbowchem.com>

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III – LIGERAMENTE PELIGROSO**

**CUIDADO**

## LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

**“NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”**

**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS”**

**“CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS”**

Este fungicida no debe aplicarse cuando haya vientos fuertes para evitar daños a cultivos susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas.

**“Este producto puede ser mortal si se ingiere”**

Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre. **“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.** Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas de caucho, visor, máscara especial para pesticidas y guantes de neopreno ó PVC, **Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.** Evite caminar dentro de la neblina de aspersión.

“ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ETIQUETADO Y CERRADO, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN”.

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”

“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN”

“NO ALMACENAR, NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES”

### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

**EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE AL PACIENTE AL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA.**

“En caso de contacto con los ojos lávelos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”.

## **“EN CASO DE INGESTIÓN NO INDUZCA EL VÓMITO, ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MAS CERCANA”**

Ingestión: No induzca el vómito. No suministre nada por vía oral a una persona inconsciente.

Contacto con la piel: Retire la ropa contaminada y lave la zona afectada con abundante agua y jabón. Llame a un médico.

En caso de intoxicación por inhalación, retire la víctima de la zona de contaminación, lleve al aire libre y mantenga al paciente acostado de medio lado. Si presenta dificultades para respirar, dar respiración artificial.

No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.



**EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono 2886012.**

### **RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN DE ENVASES VACIOS**

“Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.”

### **MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:**

No utilice el mismo equipo de fumigación de **RAINEB 70 WP**, para la aplicación de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado.

Evite contaminar con **RAINEB 70 WP** las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo.

“Tóxico para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre”

En caso de derrame, recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin”

**Para aplicaciones terrestres se deben respetar las franjas de seguridad mínimas de 10 metros, con relación a los cuerpos de agua, casas o carreteras.**

### **ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO**

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). Siempre mantenga el producto en su empaque original. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar con los desechos, envases, residuos o aguas de lavado del equipo de aplicación.



## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

### “CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO”

**RAINEB 70 WP** Pertenece al grupo químico de los ditiocarbamatos. Es un fungicida orgánico preventivo protectante, desarrollado para el control de enfermedades causadas por hongos. Es un fungicida de acción multisitio, reacciona con las enzimas sulfhidrúlicas y dificulta su acción. Impide el desarrollo de las conidias. Pertenece a los inhibidores multisitio. Tiene prolongada actividad residual.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	PC	PR
Papa	GOTA ( <i>Phytophthora infestans</i> )	2.0 Kg. por hectárea	14 días	4 horas

**P.C: Periodo de Carencia:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha

**P.R: Período de reentrada:** Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas al área o cultivo tratado.

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:** **RAINEB 70 WP** se puede aplicar en cualquier estado de desarrollo del cultivo, ofreciendo acción residual prolongada por su amplio espectro de acción. Protege por fuera y cura por dentro de la hoja, combate la enfermedad antes y después de establecida. No afecta la fotosíntesis por su coloración blanca. Su parte protectante se adhiere mejor a la hoja. No se acumula dentro de la planta, presentando una mejor dispersión en la hoja. En invierno presenta su máxima potencia.

**EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA** Revise y calibre bien los equipos. Use el volumen de agua requerido según el desarrollo del cultivo. Use boquillas de cono hueco y un tamaño de gota de 125 µm aprox.

**COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:** Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas. No mezclar con productos a base de calcio.

## INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere más información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto”.

Banda color azul





