

LEA COMPLETAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS"
 "NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO"
 "CORROSIVO, CAUSA DAÑO IRREVERSIBLE A LOS OJOS"
 "EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL, OJOS O ROPA"
(CUIDADO – ESTE PRODUCTO PODRÍA CAUSAR EXTREMADA IRRITACION EN SUS OJOS!)

CLOMAZONE RAINBOW 480 EC no debe aplicarse cuando haya vientos fuertes para evitar daños a cultivos susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas.

Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y "No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación".

Durante las aplicaciones terrestres "Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas" además equipo de protección completo: overol, guantes de neopreno ó PVC, botas de caucho, gorra, anteojos irrompibles y máscara especial para herbicidas. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión.

"Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón", en caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo.

"Conserve el producto en el envase original etiquetado y cerrado".

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS: "En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta".

• **Si el producto fue ingerido:** No induzca el vómito. Si la persona está INCONSCIENTE no le haga vomitar ni administre nada por la boca. • **Si el producto fue inhalado:** Retire al paciente del área contaminada • **Si se absorbió por piel:** Bañar al paciente con abundante agua corriente y jabón. Cambiarlo de ropa mantenerlo en reposo y abrigado. • **Si el producto cayó en los ojos:** Lavar por 15 minutos con abundante agua corriente levantando el párpado superior e inferior en forma periódica.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono: 288 6012.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

En caso de derrame, recoja y deseché acorde con la autoridad local competente. No utilice el mismo equipo de fumigación de **CLOMAZONE RAINBOW 480 EC**, para la aplicación de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado.

Evite contaminar con **CLOMAZONE RAINBOW 480 EC** las aguas que vayan a hacer utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo.

Para aplicaciones terrestres y aéreas del producto, se deben dejar franjas de seguridad de 10 y 100 metros respectivamente, con relación a los cuerpos de agua, casas o carreteras.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). Siempre mantenga el producto en su envase original. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar con los desechos, envases, residuos o aguas de lavado del equipo de aplicación.

ADVERTENCIA: "NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO".



AGM6 2 9 8

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA EL AGUA EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSITÉLO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Fecha de Aprobación ICA: 19/08/2020

HERBICIDA AGRÍCOLA**CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC****COMPOSICIÓN GARANTIZADA:****Ingrediente activo:**

Clomazone..... **480 g/L**
 2-(2-chlorobenzyl)-4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one de formulación a 20 ° C.

Ingredientes aditivos.....**c.s.p. 1 L**

Registro Nacional ICA No. 1338

Titular del Registro: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

Fecha de Formulación:**Fecha de Vencimiento:****No. de Lote:****Formulado por:**

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co. Ltd.

Binhai Economic Development Area, Weifang,

Shandong 262737, China.

Tel: 86-531-88875222 | Fax: 86-531-88875232

www.rainbowchem.com

CONTENIDO NETO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

CLOMAZONE RAINBOW 480 EC es un herbicida selectivo pre-emergente y post-emergente temprano para el cultivo del arroz que se absorbe principalmente por las raíces y ápices de los tallos de las plantas y es translocado por el xilema hasta las hojas.

El producto inhibe la biosíntesis de la clorofila y carotenoides de las especies susceptibles, impidiendo la formación de pigmentos y la formación de la clorofila. Las especies afectadas emergen del suelo carente de pigmentación (albinas), para morir posteriormente. Por ser altamente soluble, tiene la ventaja de requerir una mínima humedad para ser activado en el suelo.

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS	P.C	P.R
Arroz Oryza sativa	PATA DE GALLINA - <i>Eleusine indica</i> GUARDA ROCÍO - <i>Digitaria sanguinalis</i> PAJA MONA - <i>Leptochloa filiformis</i>	1.0 A 1.25 L/HA	15 días	0 horas

P.C: Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
P.R: Periodo de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda realizar las aplicaciones de **CLOMAZONE RAINBOW 480 EC** en pre emergencia y post emergencia temprana al cultivo (hasta 15 días después de emergido d.d.e.) y a las malezas (menos de una hoja), sobre suelos bien preparados, libres de terrones grandes y desechos de cosechas, con buenas condiciones de humedad (capacidad de campo), con el objeto de tener una buena distribución del producto sobre el perfil del suelo y así lograr una residualidad biológica más duradera, teniendo en cuenta siempre evitar charcos en la aplicación, ya que el producto es muy soluble.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: Calibre bien los equipos y asegure un tamaño y distribución de gotas uniforme. Se recomienda aplicar con boquillas de abanico plano a una presión de 40 a 50 psi.

Al aire libre, diluir la dosis del producto en la mitad del volumen de agua, haciendo un triple lavado del envase. Completar el volumen con agua agitando constantemente hasta obtener una mezcla homogénea.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: **CLOMAZONE RAINBOW 480 EC** al ser utilizado siguiendo las recomendaciones técnicas enunciadas, es seguro para el cultivo del arroz. Por lo general se presenta blanqueamiento de las plántulas de arroz posterior a su aplicación, sin embargo, estas se recuperan dentro de las 2 a 3 semanas siguientes, sin afectar la producción final del cultivo. La deriva o arrastre en las aplicaciones del herbicida puede ocasionar blanqueamiento o amarillamiento foliar en algunos cultivos, por lo tanto, no aplique el producto en lugares localizados a distancias inferiores a 300 metros de poblaciones o caseríos, con cultivos de algodón, sorgo y hortalizas y flores a cielo abierto o en invernaderos.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL: "El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II – MODERADAMENTE PELIGROSO

DAÑO

