

LEA DETENIDAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

Central de Urgencias y Emergencias de EsSalud: 117 (línea gratuita)
CICOTOX: 0800-13040 (línea gratuita)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Ningún envase que haya contenido el plaguicida debe reusarse.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de aplicación, sobrantes del producto en envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora. No permitir animales en el área tratada.

NO EXPLOSIVO - NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO



MEJORADOR DE LA CALIDAD Y VIDA POST COSECHA

Composición Garantizada:

Carboxylatos y extractos vegetales expresados
como Carbono Orgánico Oxidable Total 39.00 g/L
Calcio (CaO) 140.00g/L
Boro (B2O3) 9.6 g/L

Distribuido por:



Solandina

Av. Alfredo Benavides N° 2975 - Of. 902
Urb. A Von Humboldt - Miraflores
Lima - Perú
RUC: 20603105894

Fabricado por:



Calle Los Alamos 863
Asociación Valle Hermoso - Puente Piedra
Lima, Lima
RUC: 20602609155

Lote N°:

F. Fab:

F. Venc. :

Contenido Neto:

CARACTERÍSTICAS:

Los Carboxylatos y Extractos Vegetales de **AndiCrop Calcio-Boro** de tipo aromático incrementan la biosíntesis de pectinas, que junto con el calcio y el boro aportado en la formulación fortalecen las paredes celulares del tejido de los frutos; además de incidir en la producción de ceras, pigmentos y carbohidratos que permiten una mayor firmeza, vida de anaquel y disminución de incidencia de enfermedades de postcosecha.

MOMENTO DE APLICACIÓN: Es recomendable aplicar en las primeras etapas de floración y formación de frutos.

MODO DE APLICACIÓN: Aplicaciones foliares, puede ser aplicado con cualquier equipo de aspersión.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llenar con agua el estanque hasta la mitad de agua requerida, agregar dosis de **AndiCrop Calcio-Boro** luego completar con la otra mitad de agua requerida y agitar.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO		DOSIS/ APLICACIÓN	ÉPOCA Y NÚMERO DE APLICACIONES
Frutales	Vid, Paito, Mango, Citricos, Manzano, Duraznero, Peral	2 a 3 L/ha	Realizar de 2 a 3 aplicaciones desde formación de frutos.
	Olivo, Café, Fresa	1 a 2 L/ha	Realizar de 1 a 2 aplicaciones, desde formación de frutos.
Hortalizas	Apio, Lechuga, Col, Tomate, Aji, Páprika, Pimiento, Frijol, Espárrago, Melón, Alcachofa, Papa, Pepino, Haba, Sandía, Zapallo, Brócoli, Coiflor, Cebolla, Arveja	1 a 2 L/ha	1 a 3 aplicaciones, según ciclo del cultivo.
Otros	Arroz, Caña de Azúcar, Trigo, Maíz	1 L/ha	2 aplicaciones: en formación de primordio floral y en la primera de espiga.

PERIODO DE REINGRESO: Se puede reingresar al área tratada luego de 24 horas.

COMPATIBILIDAD: No mezclar con productos que contengan fosfatos o sulfatos; sin embargo, siempre realice una prueba de incompatibilidad antes de mezclarlo.

FITOTOXICIDAD: No existe cuando se aplica en los cultivos y dosis recomendada.

AVISO DE GARANTÍA: **Kressiendo S.A.C.** garantiza la composición y contenido publicada en esta etiqueta siempre y cuando el producto haya sido adquirido en un establecimiento autorizado y el envase de este producto cuente con su sello de seguridad, haya sido almacenado apropiadamente y se utilice antes de su fecha de expiración. **Kressiendo S.A.C.** garantiza la efectividad del producto siempre y cuando se sigan al pie de la letra las indicaciones de uso contenidas en esta etiqueta. Dado que el manejo, transporte, dosificación y aplicación de los productos están fuera de su control, **Kressiendo S.A.C.** no se hace responsable por efectos inesperados obtenidos como consecuencia del mal uso, dosificación equivocada, manejo errado o uso de productos expirados o mal conservados.