

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**GRUPO QUÍMICA:** Ethiprole: Phenylpyrazole ; Imidacloprid: Neonicotinoid

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: •MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. •NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS •NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO. •DURANTE EL MANIPULEO DEL PRODUCTO EVITAR EL CONTACTO CON LA PIEL Y MUCOSAS. NO INHALAR LOS VAPORES DEL PRODUCTO FORMULADO NI LA NEBLINA DE PULVERIZACIÓN. •USAR ROPA ADECUADA, COMO OVEROL DE MANGA LARGA, PROTEGER LOS OJOS USANDO LENTES. USAR MÁSCARA PROTECTORA ESPECIAL PROVISTA DE FILTRO, NO MANIPULAR EL PRODUCTO DIRECTAMENTE CON LAS MANOS, USAR GUANTES Y BOTAS DE GOMA. •EL USO DE ESTE PRODUCTO ES EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA. UTILIZAR SOLO LA DOSIS RECOMENDADA. •VERIFICAR QUE LOS ENVASES ESTÉN TOTALMENTE VACÍOS, LUEGO PROCEDER AL TRIPLE LAVADO E INUTILIZAR LOS ENVASES Y LLEVARLOS A LOS CENTROS DE ACOPIO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS MÁS CERCANOS A SU CENTRO DE PRODUCCIÓN. SI ES POSIBLE ENTREGAR AL PROGRAMA CAMPO LIMPIO (RECOLECCIÓN DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS) O LLEVAR AL DEPÓSITO DE ENVASES VACÍOS EN OKINAWA 1.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO: Lea cuidadosamente la etiqueta antes de usarla. Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Evite respirar el polvo. Lávese bien las manos con agua y jabón después de manejarlo y antes de comer, beber, mascar chicle, usar tabaco o usar el baño. Quite la ropa inmediatamente si el pesticida entra dentro. Luego lávese bien y póngase ropa limpia. Retirar el equipo de protección personal inmediatamente después de manipular este producto. Lave el exterior de los guantes antes de quitarlos. Tan pronto como sea posible, lávese bien y cambie a ropa limpia.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: Aves: Altamente tóxico-Prácticamente no tóxico; Peces: Ligeramente tóxico; Daphnia magna: Ligeramente tóxico; Algas: Ligeramente tóxico; Abejas: Altamente tóxico. Realizar la aplicación del producto en áreas donde no se hallen aves alimentándose o activamente en reproducción, alejar y poner a resguardo de la utilización del producto de las aves domésticas. No aplicar cerca de cuerpos de agua. No contaminar lagos, fuentes, ríos y demás canales de agua lavando los envases o vertiendo los residuos del tanque de aplicación. No aplicar con abejas presentes o sobre colmenas en actividad. Dar avisos a los apicultores cercanos antes de la aplicación para el cierre de las colmenas, si las colmenas no pueden ser cerradas, tapar la entrada durante la aplicación con espuma de gomas. Asperjar durante la mañana o la noche, fuera del horario de pecoreo de las abejas.

PRIMEROS AUXILIOS: Piel: Quite la ropa contaminada. Enjuague y lávese la piel con agua y jabón. Consultar a un médico. Ojos: Enjuagar primero con abundante agua durante varios minutos (quitarse los lentes de contacto si es posible), y luego llevar al paciente al médico. Inhalación: Mueva a la persona al aire fresco y manténgala en reposo hasta que se recupere. Si no respira, administre respiración artificial y acuda al médico. Ingestión: No induzca el vómito si la persona está consciente. Dar vaso de agua. Llame a un médico. **Notas al médico:** No posee antídoto específico. Tratar sintomáticamente.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LLAME AL 800-10-6966, CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONÉS, SANTA CRUZ - BOLIVIA

**USO AGRÍCOLA**

LEADROLE XTRA

INSECTICIDA DE CONTACTO, SISTEMICO E INGESTIÓN**Gránulos Dispersables (WG)****COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

Ethiprole: 5-amino-1-[2,6-dichloro-a,a-d-trifluoro-p-tolyl]-4-ethylsulfanylpyrazole-3-carbonitrile	400 g/kg
Imidacloprid:(E)-1-[6-chloro-3-pyridyl(methyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamino]	400 g/kg
Ingredientes inertes:	200 g/kg
Total:	1000 g/kg

■ Registro en Bolivia, SENASAG N° 3773

TITULAR DE REGISTRO:**RAINBOWCHEM AGROSCIENCE S.A.**

Dirección: Calle Los Ceibos N°2030, Barrio Grigota Av. Alemana Zona Norte,
Teléfono: +591 3 3446858 | Santa Cruz – Bolivia

FORMULADOR:**RAINBOW AGROSCIENCES (PANAMÁ), S.A.**

Dirección: PCC SPEC 9097 Local # 5, Panamá Pacífico, Veracruz, Arraijan,
Provincia de Panamá, República Panamá.
Tel.: +507-6613-8266 | E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com
Website: www.rainbowagro.com

QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD

Dirección: Xinhe Eco-chemical Science and Technology Industry Base,
Qingdao, Shandong, 266717 | Teléfono : (+86) 532 6808 1298 / 532 6808 1297
E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com | Origen - China
Website: www.rainbowagro.com

CONTENIDO NETO: 0.25Kg, 0.5Kg, 1Kg

NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO
CLASE TOXICOLÓGICA: III - LIGERAMENTE PELIGROSO

Lote #: _____
F. fabr.: _____
F. Venc.: _____

GENERALIDADES: LEADROLE XTRA es un insecticida de amplio espectro de acción sistémica, contacto e ingestión. Se absorbe por raíz, tallos u hojas y se transloca por la planta. Su principio activo **Ethiprole** actúa sobre el sistema nervioso central de la plaga, provocando su muerte. El método de acción del principio activo difiere de la mayoría de las familias insecticidas (piretroides, organofosforados, carbamatos, metilnicotínicos, etc.), motivo por el cual se disminuye la probabilidad de que las plagas se vuelvan resistentes a dicho principio activo. El **Imidacloprid** es un insecticida sistémico que significa que es absorbido por las plantas, principalmente a través de las raíces, y transportados dentro del sistema vascular de la planta donde se puede afectar la alimentación de la planta-plagas.

CONDICIONES PARA SU APLICACIÓN: No aplicar con vientos mayores a 10 km/hora. Aplicar en dirección a favor del viento, nunca en contra porque podría ser peligroso para el aplicador y por la deriva a cultivos vecinos o áreas vecinas. Evitar realizar la aplicación en horas más calurosas del día. Realizar la aplicación preferentemente en las últimas horas de la tarde o primeras horas de la mañana. No aplicar si hay amenazas de lluvia inminente. No aplicar sobre follaje mojado ni en ambiente con excesiva neblina o rocío. No aplicar si la humedad relativa está por debajo del 60%. No aplicar con temperaturas superiores a los 27°C.

MÉTODO DE APLICACIÓN: Aplicaciones aéreas: Usar micronair o barra equipada con boquillas cónicas D2 a D12, altura de vuelo de 2 a 4 m, presión de bomba 30 a 50 lb/pul2, caudal de 10 a 20 l/ha para micronair y 20 a 30 l/ha cuando se emplea barra, largura de barra de deposición 15 a 18 m, con densidad mínima de 80 gotas/cm2. Aplicación terrestre: El producto debe ser diluido y aplicado en forma de pulverización. Usar pulverizadores de barra equipadas con boquillas tipo cónicas o abanico, utilizando 200 – 300 l de agua/ha. Para los otros tipos de fumigadoras, se recomienda hacer una distribución uniforme sobre las plantas.

INSTRUCCIONES DE USO: LEADROLE XTRA es un gránulo dispersable que debe diluirse en agua. Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones: Verificar que el equipo de aplicación se encuentre correctamente calibrado. Agregar agua al tanque hasta la mitad de su volumen. Poner en funcionamiento el sistema de agitación, Agregar la cantidad necesaria de acuerdo a la calibración realizada, directamente al tanque y sin disolución previa. Continuar con la agitación y corroborar que el producto se disuelva adecuadamente. Completar el llenado del tanque con agua, hasta el volumen final. En caso de ser necesario sin detener la agitación, agregar el coadyuvante que corresponda, verificando el correcto mezclado. Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento. Utilizar siempre agua limpia. Usar dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto.

NÚMERO Y MOMENTO DE APLICACIÓN: Realizar la aplicación cuando se tenga un promedio de 1 chinche por metro lineal, iniciar el control en estadios R3 a R5 junto con la aplicación de fungicidas. Realizar máximo 2 aplicaciones por campaña, en caso de reinfestación aplicar insecticidas de diferente modo de acción.

TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: No reingresar al área tratada hasta después de 24 horas de haber aplicado el producto. De ser necesario el reingreso antes del plazo, hacerlo empleando equipos de protección personal.

PERÍODO de carencia: Soya: 21 días**FITOTOXICIDAD:** A la dosis indicada LEADROLE XTRA no es fitotóxico para el cultivo que se recomienda.**COMPATIBILIDAD:** Evitar el contacto con agentes oxidantes fuertes.

CULTIVO	PLAGA DE CONTROLADA	DOSIS (g/ha)
Soya (<i>Glycine max L.</i>)	Chinche café panza verde (<i>Dichelops furcatus</i>)	100 - 150

LMR: Imidacloprid: 0.01 mg/kg

RESPONSABILIDAD LEGAL: "El Titular del registro garantiza que las características del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas".



CUIDADO

