

THANAVIN®

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

COMPOSICIÓN:

Methomyl.....900 g/kg
Excipientes c.s.p.....1kg

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

“VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Registro Nacional No: 1 – I 24 / NA

CONTENIDO NETO: 100 gramos

No. Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

P.V.P.:

Titular de Registro:
SINO-CHEMICAL S.A.

Av. Colón Oe 331 y Versalles, edificio Villareal Duran Hnos., Segundo piso, Quito-Ecuador

Formulado por:



SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD
Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong, China
262737.
www.rainbowagro.com

SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD
30th Floor, Building A5-5, Hanyu Financial Center, No.7000 Jingshi
Road, Jinan Innovation Zone, Jinan, Shandong, China 250101.

QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD
Xinhe Eco-chemical Science and Technology Industry Base,
Qingdao, Shandong, China 266717

RAINBOW AGROSCIENCES (PANAMA), S.A
PCC Spec 9097, Local 5#, Panama Pacifico. Rep. De Panama

Distribuido por:

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Precauciones y advertencias de uso y aplicación

El producto es TÓXICO en caso de ingestión, inhalación, y/o contacto con la piel.

Medidas relativas a la seguridad: No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”

Almacenamiento y manejo del producto:

Almacenar en un lugar seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

Medidas relativas a primeros auxilios:

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de ingestión, no induzca el vómito.

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.”



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:

1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día.
SINO-CHEMICAL S.A. Teléfono 0992500795-Quito.

Medidas relativas para la disposición de envases vacíos:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilícelo cortando la funda, coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.

Medidas relativas para la protección del ambiente

Tóxico para aves y animales domésticos. “No permita animales en el área tratada”. Tóxico para la flora y fauna. “Evite el derrame o la deriva por rociado” “Tóxico para organismos acuáticos” “No contaminar ríos, arroyos, estanques o lagos con desechos de productos químicos o envases vacíos”. Para la aplicación se establece una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano. No permita animales en el área tratada. Altamente tóxico para abejas. “No aplique en cultivos en floración” “No aplique en horas de actividad de abejas” “Alerte a los apicultores de las aplicaciones si existen granjas cercanas. “No aplicar si existen granjas avícolas en los alrededores”.

Instrucciones de uso y manejo:

Modo de empleo: Regular el pH del agua a 6 y adicionar un adherente. Llene el tanque con agua hasta la mitad de su capacidad, empiece a agitar, sacar la funda hidrosoluble y sumérgala completamente; continúe el llenado hasta completar el volumen deseado. Agitar hasta conseguir un caldo homogéneo.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga	Dosis	Periodo de Carencia
Maíz (<i>Zea mays</i>)	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	0.2 kg/ha	21 días
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Trips (<i>Frankliniella tuberosi</i>)	0.1 kg/ha	6 días

Volumen de agua: Maíz y Papa: 200 litros/hectárea

Época y frecuencia de aplicación: **Maíz:** Una sola aplicación, con los primeros síntomas de la plaga. **Papa:** Una aplicación en etapa de desarrollo/floración, con umbral de 5 adultos/planta.

Periodo de reingreso: 48 horas.

Fitotoxicidad: Empleado bajo las condiciones descritas no presenta fitotoxicidad para el cultivo.

Compatibilidad: Incompatible con bases fuertes.

Responsabilidad: “El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

PRODUCTO DE USO RESTRINGIDO: SOLO PARA EL CONTROL DE GUSANO COGOLLERO (*Spodoptera frugiperda*) EN EL CULTIVO DE MAÍZ (*Zea mays*) Y TRIPS (*Frankliniella tuberosi*) EN EL CULTIVO DE PAPA (*Solanum tuberosum*)

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: Ib - ALTAMENTE PELIGROSO



TÓXICO

