

KEYROLE 500

INSECTICIDA AGRICOLA

Gránulos Dispersables en agua (WG)

Composición:

Clothianidin 500 g/kg
Excipientes.....c.s.p. 1 kg

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Registro Nacional. 122 – I 2/NA

CONTENIDO NETO: 5 Kg.

Lote N°:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

P.V.P.:

Titular del Registro:

SINOCHEMICAL S.A.

Av. Colón Oe 3-31 entre Versalles y Ulloa Edificio Villareal Durán Hnos. 2do piso. Quito-Ecuador

Formulado por:	Distribuido por:
 <p>SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD. 30th Floor, Building A5-5, Hanyu Financial Center, No.7000 Jingshi Road, Jinan Innovation Zone, Jinan, Shandong, China 250101. www.rainbowagro.com</p> <p>SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD. Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong, China 262737.</p> <p>QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD. Xinhe Eco-chemical Science and Technology Industry Base, Qingdao, Shandong, China 266717.</p> <p>RAINBOW AGROSCIENCES (PANAMA), S.A. PCC Spec 9097, Local 5#, Panama Pacifico. Rep. de Panamá.</p>	

CUIDADO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: Nocivo por ingestión. Nocivo por inhalación. Causa irritación a los ojos. Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada. Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión). Evitar el contacto del producto con la boca, piel y los ojos.

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD: No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora como camisa manga larga, pantalón largo, botas de caucho, visor, guantes y mascarilla durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

Almacenamiento y manejo del producto: Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

Medidas relativas a primeros auxilios:

En caso de inhalación: conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de contacto con la piel: retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de ingestión: No induzca el vómito.

Síntomas de intoxicación incluyen: puede causar náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, mareo, dolor de cabeza, y sedación leve.

Tratamiento y Antídoto: No existe antídoto específico, suministrar tratamiento sintomático y de soporte.

" En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta".



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366), atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.
SINO-CHEMICAL S.A: 0992500795

Medidas relativas para la disposición de envases vacíos: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilícelo cortando la funda, colóquelo en un contenedor y entregue al distribuidor para su disposición final.

Medidas relativas para la protección del ambiente: "No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos". "Utilizar equipos calibrados y la dosis recomendada para disminuir el escurrimiento del producto". "Para la aplicación terrestre, se establece una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensibles tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano". "Realizar la aplicación en un suelo a capacidad de campo y con un máximo desarrollo vegetativo en la planta". "Evitar las aplicaciones cuando el suelo se encuentre saturado o este lloviendo". "Realizar las aplicaciones de manera dirigida al cultivo". "Tóxico para las abejas por lo tanto la aplicación realizar con las cortinas cerradas en las primeras horas de la mañana o en las últimas de la tarde es decir evitar aplicar en cultivos en etapa de floración o en horarios de mayor actividad para las abejas". "Cortar las malezas de los alrededores del cultivo para evitar la presencia de abejas".

Instrucciones de uso y manejo:

Es un insecticida con acción translinar y actividad sistémica radicular, actúa como agonista del receptor nicotínico de la acetilcolina, que afecta las sinapsis en el sistema nervioso central del insecto.

Modo de empleo:

Disolver en agua la dosis recomendada de producto a utilizar en un recipiente pequeño destinado solo para este efecto, cuando esté disuelto completamente, viértalo en el tanque o la mochila de aplicación que deben tener la mitad del volumen total del agua a utilizar, agitar y completar el volumen de agua, volver agitar frecuentemente hasta conseguir una mezcla homogénea. Durante la manipulación del producto use el equipo de protección completo. No guardar la mezcla, preparar lo necesario para la aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PC (Período de carencia)
Tomate Riñón (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Mosca Blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	180 g/ha	7 días
Brócoli (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis subvar. cymosa</i>)	Palomilla dorso de diamante (<i>Plutella xylostella</i>)	0.16 kg/ha	
Rosas (<i>Rosa</i> sp.)	Pulgón (<i>Myzus persicae</i>)	160 g/ha	No aplica

* Volumen de agua: Tomate Riñón: 600 l/ha, Brócoli: 666 l/ha, Rosas: 1000 l/ha.

RESTRICCIÓN DE USO:

Mosca blanca (*Trialeurodes vaporariorum*), en el cultivo Tomate Riñón (*Lycopersicon esculentum*), bajo condiciones de invernadero, Pulgón (*Myzus persicae*) en el cultivo de Rosas (*Rosa* sp).

Época y frecuencia de aplicación:

Tomate riñón: Aplicar cuando exista la presencia mínima de 10 adultos de mosca blanca por hoja, bajo condiciones de invernadero. Se recomienda efectuar una sola aplicación por ciclo.

Brócoli: Debe aplicarse por una sola ocasión, cuando el cultivo se encuentre a 2 meses después de la siembra, estado fenológico del cultivo vegetativo, con una presencia de 1 larva por planta.

Rosas: aplicar en una sola ocasión cuando el cultivo se encuentre en estado fenológico de floración y presente dos pulgones por planta.

Período de reingreso: En un mínimo de 12 horas después de la aplicación.

Fitotoxicidad: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

Incompatibilidad: KEYROLE 500 es incompatible con ácidos fuertes. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad a pequeña escala en caso de existir duda de compatibilidad con nuevas formulaciones.

Responsabilidad: "El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III - LIGERAMENTE PELIGROSO

